



**FARMA - CHEM SA**

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047  
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: [info@farmachem.gr](mailto:info@farmachem.gr)

**ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**

**ΠΡΟΪΟΝ:**

**SOAP – K**

Εξειδικευμένο σκεύασμα Καλίου για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών, για διαφυλλική χρήση.

Σύνθεση	% w/w
ΚΑΛΙΟ (K2O) (υδατοδιαλυτό)	5
Οργανικά συστατικά	70

**Λίπασμα Νέου Τύπου/Ομάδα Γ**

**Αρ.Κυκλοφορίας:**

pH	9,4
Αγωγιμότητα	0,38 mS/cm

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Το SOAP - K υγρό διάλυμα καλίου για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοπενιών καλίου ευνοώντας παράλληλα την ωρίμανση των καρπών. Ενισχύει την παραγωγή και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών όπως το χρώμα, τη γεύση, τη συνεκτικότητα, τα σάκχαρα και τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής. Επίσης, η εφαρμογή του SOAP-K συνιστάται σε συνθήκες θερμικού στρες. Η συγκεκριμένη μορφή του Καλίου που βρίσκεται στο SOAP-K, διαθέτει τασιενεργές ιδιότητες με αποτέλεσμα το σκεύασμα να λειτουργεί σαν ένας φυσικός «διαβρέκτης» που βοηθά την είσοδο των ιόντων Καλίου στο φύλλωμα. Λόγω της ειδικής του οργανικής σύνθεσης το SOAP - K βοηθά ακόμη στην απομάκρυνση των μελιτωμάτων στα φυτά. Το SOAP - K είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

Εφαρμόζεται μόνο με ψεκασμούς φυλλώματος.

**Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρειπ φρούτ)**: Συστήνονται ψεκασμοί 2-3 φορές το χρόνο, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά)**: Συστήνονται 2-4 ψεκασμοί, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

**Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο)**: Συστήνονται ψεκασμοί 2-3 φορές το χρόνο, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 300-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φράουλα**: Συστήνονται 2-4 εφαρμογές στη σεζόν, κατά την αύξηση του καρπού ανά 15 μέρες. Δόση: 300-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, λαχανικά (φασόλια, μπιζέλια, λάχανα, κουνουπίδια)**: Συστήνονται 2-4 ψεκασμοί, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Καρπούζι-πεπόνι**: Συστήνονται 2-3 εφαρμογές ανά 15 ημέρες, όποτε απαιτείται. Δόση: 300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

**Βαμβάκι, Καπνός**: Συστήνονται 2-4 εφαρμογές, ανά 15 ημέρες, όποτε απαιτείται. Δόση:

300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ανθοκομικά:** Συστήνονται εφαρμογές στο άνοιγμα των λουλουδιών και ανά 15 ημέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

#### **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και ροτενόνη. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Καλό θα είναι το νερό του ψεκασμού να μην είναι "σκληρό". Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό ρΗ, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται πριν την εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.